

## Paratyphoid

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2563 พบผู้ป่วย 94 ราย จาก 27 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.14 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.74 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 55-64 ปี (18.09 %) 0-4 ปี (17.02 %) 45-54 ปี (15.96 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 97.9 อื่นๆร้อยละ 1.1 พม่าร้อยละ 1.1 อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 33.0 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 29.8 เกษตรร้อยละ 14.9

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ แม่ฮ่องสอน (2.12 ต่อแสนประชากร) เชียงใหม่ (0.91 ต่อแสนประชากร) นครศรีธรรมราช (0.83 ต่อแสนประชากร) เลย (0.78 ต่อแสนประชากร) จันทบุรี (0.56 ต่อแสนประชากร)

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคเหนือ 0.25 ต่อแสนประชากร ภาคใต้ 0.22 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.10 ต่อแสนประชากร ภาคกลาง 0.09 ต่อแสนประชากรตามลำดับ



- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (4 ราย), 1 ปี (4 ราย), 45-54 ปี (3 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (4 ราย), 15-24 ปี (4 ราย), 55-64 ปี (4 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (9 ราย), 25-34 ปี (5 ราย), 15-24 ปี (4 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (5 ราย), 35-44 ปี (4 ราย), 55-64 ปี (3 ราย),



Number of Paratyphoid cases by week of onset and region.

