


Filariasis

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2563 พบผู้ป่วย 5 ราย จาก 4 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.01 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.67 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 45-54 ปี (40.00 %) 0-4 ปี (20.00 %) 35-44 ปี (20.00 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 100.0 อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรร้อยละ 80.0 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 20.0

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ นราธิวาส (0.25 ต่อแสนประชากร) ระยอง (0.14 ต่อแสนประชากร) กาญจนบุรี (0.11 ต่อแสนประชากร) สงขลา (0.07 ต่อแสนประชากร) ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคใต้ 0.03 ต่อแสนประชากร ภาคกลาง 0.01 ต่อแสนประชากร ภาคเหนือ 0.00 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.00 ต่อแสนประชากรตามลำดับ



- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (1 ราย), 0-27 วัน (1 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (1 ราย), 45-54 ปี (1 ราย), 55-64 ปี (1 ราย),



Number of Filariasis cases by week of onset and region. 2563

