


Diarrhoea


ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2564 พบผู้ป่วย 538608 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 813.96 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.44 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ >65 ปี (16.08 %) 25-34 ปี (13.19 %) 15-24 ปี (12.22 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 98.4 พม่าร้อยละ 0.7 อื่นๆร้อยละ 0.7 กัมพูชาร้อยละ 0.2 ลาวร้อยละ 0.1 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.0 มาเลเซียร้อยละ 0.0 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 29.2 รับจ้างร้อยละ 23.5 เกษตรร้อยละ 20.3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ อำนาจเจริญ (1982.46 ต่อแสนประชากร) มุกดาหาร (1858.41 ต่อแสนประชากร) ปราจีนบุรี (1772.37 ต่อแสนประชากร) มหาสารคาม (1586.61 ต่อแสนประชากร) จันทบุรี (1567.40 ต่อแสนประชากร)

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 965.36 ต่อแสนประชากร ภาคเหนือ 915.26 ต่อแสนประชากร ภาคกลาง 673.80 ต่อแสนประชากร ภาคใต้ 652.32 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ



- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (30258 ราย), 15-24 ปี (23844 ราย), 35-44 ปี (19476 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (40233 ราย), 55-64 ปี (27131 ราย), 45-54 ปี (25605 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (19334 ราย), 55-64 ปี (14135 ราย), 15-24 ปี (11187 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (9447 ราย), 15-24 ปี (8372 ราย), >65 ปี (7635 ราย),



Number of Diarrhoea cases by week of onset and region.
2564

