


Typhoid

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2564 พบผู้ป่วย 319 ราย จาก 49 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.48 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.96 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ 45-54 ปี (17.87 %) 35-44 ปี (16.93 %) >65 ปี (15.36 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 97.8 พม่าร้อยละ 1.9 อื่นๆร้อยละ 0.3 อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 33.5 เกษตรร้อยละ 23.8 นักเรียนร้อยละ 17.6

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ **เลย** (5.79 ต่อแสนประชากร) **ยโสธร** (4.69 ต่อแสนประชากร) **นราธิวาส** (3.46 ต่อแสนประชากร) **เชียงใหม่** (3.30 ต่อแสนประชากร) **สงขลา** (3.28 ต่อแสนประชากร)

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคใต้ 1.01 ต่อแสนประชากร ภาคเหนือ 0.95 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.40 ต่อแสนประชากร ภาคกลาง 0.08 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ



- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (6 ราย), 55-64 ปี (4 ราย), 45-54 ปี (3 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (26 ราย), 35-44 ปี (18 ราย), 55-64 ปี (17 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (22 ราย), 35-44 ปี (22 ราย), >65 ปี (17 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (19 ราย), >65 ปี (13 ราย), 45-54 ปี (13 ราย),

