

Paratyphoid

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2564 พบผู้ป่วย 50 ราย จาก 26 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.08 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.92 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ 35-44 ปี (18.00 %) 45-54 ปี (16.00 %) >65 ปี (16.00 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 100.0 อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 32.0 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 26.0 นักเรียนร้อยละ 16.0

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ แม่ฮ่องสอน (0.70 ต่อแสนประชากร) นครศรีธรรมราช (0.58 ต่อแสนประชากร) ยโสธร (0.56 ต่อแสนประชากร) จันทบุรี (0.56 ต่อแสนประชากร) สิงห์บุรี (0.49 ต่อแสนประชากร)

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคใต้ 0.18 ต่อแสนประชากร ภาคเหนือ 0.11 ต่อแสนประชากร ภาคกลาง 0.05 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.04 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ



- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (2 ราย), 55-64 ปี (2 ราย), 15-24 ปี (2 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (1 ราย), 25-34 ปี (1 ราย), 55-64 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (4 ราย), 25-34 ปี (4 ราย), 15-24 ปี (2 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (5 ราย), 35-44 ปี (3 ราย), 45-54 ปี (3 ราย),

