

Malaria



ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2564 พบผู้ป่วย 786 ราย จาก 33 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.19 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.46 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ 15-24 ปี (19.97 %) 25-34 ปี (18.32 %) 35-44 ปี (13.74 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 78.9 พม่าร้อยละ 15.5 อื่นๆร้อยละ 5.6 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 28.5 เกษตรร้อยละ 27.1 รับจ้างร้อยละ 23.4

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ ตาก (29.56 ต่อแสนประชากร) แม่ฮ่องสอน (17.49 ต่อแสนประชากร) กาญจนบุรี (14.09 ต่อแสนประชากร) ประจวบคีรีขันธ์ (13.20 ต่อแสนประชากร) ยะลา (11.99 ต่อแสนประชากร)

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคเหนือ 2.35 ต่อแสนประชากร ภาคกลาง 1.48 ต่อแสนประชากร ภาคใต้ 1.47 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.12 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ



- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (68 ราย), 25-34 ปี (54 ราย), 10-14 ปี (48 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (11 ราย), 15-24 ปี (5 ราย), >65 ปี (3 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (67 ราย), 25-34 ปี (50 ราย), 10-14 ปี (45 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (33 ราย), 25-34 ปี (29 ราย), 15-24 ปี (17 ราย),



ชนิดของเชื้อ/สาร	จำนวน	ร้อยละ
PF : Plasmodium falciparum	66	8.4
PV : Plasmodium vivax	469	59.7
PM : Plasmodium malariae	13	1.7
Mixed type	2	0.3
Unknown	236	30.0

© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health