


L.G.V.&other&unsp.V.D.

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2564 พบผู้ป่วย 110 ราย จาก 39 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.17 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.75 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ 15-24 ปี (36.36 %) 25-34 ปี (20.91 %) 35-44 ปี (17.27 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 99.1 พม่าร้อยละ 0.9 อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 36.4 นักเรียนร้อยละ 25.5 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 16.4

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ แม่ฮ่องสอน (1.05 ต่อแสนประชากร) เชียงราย (1.00 ต่อแสนประชากร) ยโสธร (0.94 ต่อแสนประชากร) ระยอง (0.80 ต่อแสนประชากร) อุบลราชธานี (0.64 ต่อแสนประชากร)

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคเหนือ 0.30 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.16 ต่อแสนประชากร ภาคใต้ 0.15 ต่อแสนประชากร ภาคกลาง 0.11 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (9 ราย), 15-24 ปี (6 ราย), 25-34 ปี (6 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (12 ราย), 25-34 ปี (7 ราย), 35-44 ปี (6 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (17 ราย), 25-34 ปี (7 ราย), 45-54 ปี (4 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (5 ราย), 45-54 ปี (4 ราย), 25-34 ปี (3 ราย),



Number of L.G.V.&other&unsp.V.D. cases by week of onset and region

