

Filariasis


ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2564 พบผู้ป่วย 3 ราย จาก 3 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.00 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 2.00 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ 15-24 ปี (66.67 %) 45-54 ปี (33.33 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 66.7 พม่าร้อยละ 33.3 อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรร้อยละ 33.3 นักเรียนร้อยละ 33.3 รับจ้างร้อยละ 33.3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ เชียงราย (0.08 ต่อแสนประชากร) ศรีสะเกษ (0.07 ต่อแสนประชากร) นครศรีธรรมราช (0.06 ต่อแสนประชากร)

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคใต้ 0.01 ต่อแสนประชากร ภาคเหนือ 0.01 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.00 ต่อแสนประชากร ภาคกลาง 0.00 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ



- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1 ราย),



Number of Filariasis cases by week of onset and region.
2564

