


Condyloma Acuminata


ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2564 พบผู้ป่วย 2828 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 4.27 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.72 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ 15-24 ปี (48.16 %) 25-34 ปี (23.02 %) 35-44 ปี (12.94 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.3 อื่นๆร้อยละ 2.4 พม่าร้อยละ 1.6 ลาวร้อยละ 0.5 กัมพูชาร้อยละ 0.2 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 30.9 นักเรียนร้อยละ 27.4 ไม่ทราบอาชีพ/ไม่ปกครองร้อยละ 22.6

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ สิงห์บุรี (17.60 ต่อแสนประชากร) ภูเก็ต (13.61 ต่อแสนประชากร) พะเยา (13.35 ต่อแสนประชากร) หนองคาย (9.29 ต่อแสนประชากร) จันทบุรี (8.95 ต่อแสนประชากร)

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคเหนือ 5.04 ต่อแสนประชากร ภาคกลาง 4.61 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.12 ต่อแสนประชากร ภาคใต้ 2.72 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ



- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (385 ราย), 25-34 ปี (294 ราย), 35-44 ปี (182 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (509 ราย), 25-34 ปี (166 ราย), 35-44 ปี (93 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (356 ราย), 25-34 ปี (121 ราย), 35-44 ปี (49 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (106 ราย), 25-34 ปี (68 ราย), 35-44 ปี (40 ราย),



Number of Condyloma Acuminata cases by week of onset and regio 2564

