


Chikungunya

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2564 พบผู้ป่วย 671 ราย จาก 39 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.01 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.45 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ 45-54 ปี (19.37 %) 25-34 ปี (18.78 %) 35-44 ปี (16.39 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.2 อื่นๆร้อยละ 3.6 ลาวร้อยละ 0.6 พม่าร้อยละ 0.3 กัมพูชาร้อยละ 0.3 อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 27.9 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 26.5 นักเรียนร้อยละ 19.5

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ **จันทบุรี** (15.10 ต่อแสนประชากร) **บึงกาฬ** (9.00 ต่อแสนประชากร) **สุรินทร์** (8.21 ต่อแสนประชากร) **กรุงเทพมหานคร** (5.14 ต่อแสนประชากร) **ระยอง** (3.06 ต่อแสนประชากร)

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคกลาง 1.83 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.59 ต่อแสนประชากร ภาคใต้ 0.42 ต่อแสนประชากร ภาคเหนือ 0.38 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ



- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (90 ราย), 45-54 ปี (80 ราย), 25-34 ปี (78 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (24 ราย), 10-14 ปี (21 ราย), 25-34 ปี (19 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (11 ราย), 45-54 ปี (10 ราย), 35-44 ปี (8 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (11 ราย), 15-24 ปี (7 ราย), 25-34 ปี (6 ราย),

