

Botulism



ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2564 พบผู้ป่วย 4 ราย จาก 2 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.01 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.00 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ 15-24 ปี (75.00 %) 45-54 ปี (25.00 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 100.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 50.0 นักเรียนร้อยละ 25.0 รับจ้างร้อยละ 25.0

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ นครราชสีมา (0.11 ต่อแสนประชากร) เชียงใหม่ (0.06 ต่อแสนประชากร)

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.01 ต่อแสนประชากร ภาคเหนือ 0.01 ต่อแสนประชากร ภาคใต้ 0.00 ต่อแสนประชากร ภาคกลาง 0.00 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ



- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (3 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health