

Enterovirus Fever


ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2564 พบผู้ป่วย 61 ราย จาก 7 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.09 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.79 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ 2 ปี (24.59 %) 3 ปี (19.67 %) 1 ปี (13.11 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.1 อื่นๆร้อยละ 3.3 มาเลเซียร้อยละ 1.6 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 93.4 นักเรียนร้อยละ 4.9 รับจ้างร้อยละ 1.6

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ เชียงราย (2.23 ต่อแสนประชากร) สงขลา (0.70 ต่อแสนประชากร) ขอนแก่น (0.28 ต่อแสนประชากร) กรุงเทพมหานคร (0.25 ต่อแสนประชากร) พิษณุโลก (0.12 ต่อแสนประชากร)

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคเหนือ 0.26 ต่อแสนประชากร ภาคใต้ 0.11 ต่อแสนประชากร ภาคกลาง 0.06 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.03 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ



- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 2 ปี (3 ราย), 35-44 ปี (2 ราย), 9-11 เดือน (2 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (1 ราย), 3 ปี (1 ราย), 2 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 2 ปี (9 ราย), 3 ปี (6 ราย), 4 ปี (5 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 3 ปี (5 ราย), 2 ปี (2 ราย), 1 ปี (1 ราย),



Number of Enterovirus Fever cases by week of onset and region.

