

## Cholera

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2565 พบผู้ป่วย 5 ราย จาก 5 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.01 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.50 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 55-64 ปี (40.00 %) >65 ปี (20.00 %) 0-4 ปี (20.00 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 80.0 อื่นๆร้อยละ 20.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 60.0 งานบ้าน ร้อยละ 20.0 รับจ้างร้อยละ 20.0

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ


แรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 1 ปี (1 ราย), 55-64 ปี (1 ราย), 45-54 ปี (1 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (1 ราย), 55-64 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ



อัตราต่อแสนประชากร



ชนิดของเชื้อ/สาร	จำนวน	ร้อยละ
Vibrio cholerae Eltor Inaba	1	20.0
Vibrio Cholerae Eltor Ogawa	1	20.0
NA	3	60.0