

Diarrhoea

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2565 พบผู้ป่วย 656020 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 991.39 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.45 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 0-4 ปี (16.88 %) >65 ปี (14.86 %) 25-34 ปี (13.60 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 97.8 อื่นๆร้อยละ 1.0 พม่าร้อยละ 0.8 กัมพูชาร้อยละ 0.2 ลาวร้อยละ 0.1 มาเลเซียร้อยละ 0.0 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.0 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 30.0 รับจ้างร้อยละ 24.0 นักเรียนร้อยละ 19.5

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (38525 ราย), 15-24 ปี (30746 ราย), 35-44 ปี (23769 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (43159 ราย), 55-64 ปี (29528 ราย), 45-54 ปี (26333 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (21660 ราย), 55-64 ปี (15301 ราย), 25-34 ปี (13470 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (13592 ราย), 15-24 ปี (12184 ราย), >65 ปี (9898 ราย),

