


Dysentery, Bacillary

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2565 พบผู้ป่วย 377 ราย จาก 43 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.57 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.13 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ >65 ปี (16.98 %) 25-34 ปี (15.38 %) 0-4 ปี (14.32 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 97.3 กัมพูชาร้อยละ 0.8 พม่าร้อยละ 0.8 อื่นๆร้อยละ 0.5 มาเลเซียร้อยละ 0.3 ลาวร้อยละ 0.3 อาชีพรุ่นใหญ่ รับจ้างร้อยละ 30.0 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 22.5 เกษตรร้อยละ 21.5

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (36 ราย), 15-24 ปี (28 ราย), 35-44 ปี (21 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (22 ราย), 55-64 ปี (18 ราย), 35-44 ปี (15 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (12 ราย), 25-34 ปี (8 ราย), 55-64 ปี (6 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (15 ราย), 25-34 ปี (8 ราย), 15-24 ปี (8 ราย),



Number of Dysentery, Bacillary cases by week of onset and region.

