


Dysentery, Amoebic

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2565 พบผู้ป่วย 1269 ราย จาก 57 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.92 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.04 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ >65 ปี (17.49 %) 0-4 ปี (17.02 %) 55-64 ปี (13.48 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 97.7 พม่าร้อยละ 1.5 กัมพูชาร้อยละ 0.4 อื่นๆร้อยละ 0.2 ลาวร้อยละ 0.2 อาชีพส่วนใหญ่ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 28.6 รับจ้างร้อยละ 25.8 เกษตรร้อยละ 21.4

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (31 ราย), 35-44 ปี (25 ราย), 15-24 ปี (18 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (82 ราย), 55-64 ปี (55 ราย), 45-54 ปี (55 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (101 ราย), 55-64 ปี (90 ราย), 45-54 ปี (80 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (25 ราย), 25-34 ปี (23 ราย), 55-64 ปี (16 ราย),



Number of Dysentery, Amoebic cases by week of onset and region
2565

