

Dysentery, Amoebic


d50665

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2565 พบผู้ป่วย 1263 ราย จาก 58 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.91 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.04 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ >65 ปี (17.81 %) 0-4 ปี (16.79 %) 55-64 ปี (13.62 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 97.3 พม่าร้อยละ 1.6 อื่นๆร้อยละ 0.5 กัมพูชาร้อยละ 0.4 ลาวร้อยละ 0.2 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 28.5 รับจ้างร้อยละ 25.7 เกษตรร้อยละ 21.7


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (31 ราย), 35-44 ปี (25 ราย), 15-24 ปี (18 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (85 ราย), 55-64 ปี (57 ราย), 45-54 ปี (55 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (101 ราย), 55-64 ปี (89 ราย), 45-54 ปี (79 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (25 ราย), 25-34 ปี (23 ราย), 55-64 ปี (16 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



Number of Dysentery, Amoebic cases by week of onset and region 2565

