

## Typhoid

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2565 พบผู้ป่วย 726 ราย จาก 42 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.10 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.97 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 45-54 ปี (19.97 %) >65 ปี (16.12 %) 35-44 ปี (16.12 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 93.8 พม่าร้อยละ 3.4 อื่นๆร้อยละ 2.8 อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 32.2 เกษตรร้อยละ 29.1 ไม่ทราบอาชีพ/ไม่ปกครองร้อยละ 17.2

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ

แรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (11 ราย), 15-24 ปี (9 ราย), 35-44 ปี (8 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (39 ราย), >65 ปี (34 ราย), 55-64 ปี (28 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (63 ราย), >65 ปี (55 ราย), 35-44 ปี (55 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (34 ราย), 45-54 ปี (32 ราย), 55-64 ปี (27 ราย),

