

Paratyphoid

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2565 พบผู้ป่วย 89 ราย จาก 26 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.13 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.89 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 35-44 ปี (25.84 %) >65 ปี (16.85 %) 45-54 ปี (13.48 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 97.8 อื่นๆร้อยละ 1.1 พม่าร้อยละ 1.1 อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 44.9 เกษตรร้อยละ 23.6 นักเรียนร้อยละ 12.4

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (4 ราย), 55-64 ปี (3 ราย), >65 ปี (3 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (4 ราย), 15-24 ปี (3 ราย), >65 ปี (3 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (13 ราย), 55-64 ปี (7 ราย), 45-54 ปี (6 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (5 ราย), 45-54 ปี (3 ราย), >65 ปี (3 ราย),

