

D.H.F.shock syndrome

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2565 พบผู้ป่วย 369 ราย จาก 67 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.56 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 20 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.03 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.03 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (24.12 %) 10-14 ปี (20.87 %) 25-34 ปี (13.82 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.9 พม่าร้อยละ 2.2 อื่นๆร้อยละ 1.4 ลาวร้อยละ 0.5 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 45.3 รับจ้างร้อยละ 21.7 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 13.6


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ


- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (45 ราย), 25-34 ปี (31 ราย), 10-14 ปี (25 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (21 ราย), 15-24 ปี (12 ราย), 25-34 ปี (7 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (17 ราย), 15-24 ปี (15 ราย), 55-64 ปี (12 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (20 ราย), 15-24 ปี (17 ราย), 7-9 ปี (11 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health