


Pulmonary T.B.


ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2565 พบผู้ป่วย 9286 ราย จาก 73 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 14.03 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 12 ราย คิดเป็นอัตราราย 0.02 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.46 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ >65 ปี (28.89 %) 55-64 ปี (21.29 %) 45-54 ปี (19.58 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.4 อื่นๆร้อยละ 1.7 พม่าร้อยละ 1.4 กัมพูชาร้อยละ 0.3 ลาวร้อยละ 0.2 มาเลเซียร้อยละ 0.1 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 35.7 เกษตรร้อยละ 24.1 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 16.2

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ระนอง สงขลา ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (723 ราย), 45-54 ปี (531 ราย), 55-64 ปี (519 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (1190 ราย), 55-64 ปี (871 ราย), 45-54 ปี (784 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (602 ราย), 55-64 ปี (443 ราย), 45-54 ปี (346 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (168 ราย), 35-44 ปี (164 ราย), 45-54 ปี (157 ราย),



Number of Pulmonary T.B. cases by week of onset and region. 2565



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health