

T.B. other organs


ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ตั้งแต่วันที่ 1มค 2565 - 11 กพ 65 พบผู้ป่วย 736 ราย จาก 34 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.11 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.54 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ >65 ปี (20.92 %) 45-54 ปี (20.24 %) 55-64 ปี (18.89 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 98.1 พม่าร้อยละ 1.6 อื่นๆร้อยละ 0.1 กัมพูชาร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 38.6 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 29.6 เกษตรร้อยละ 13.2

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ สงขลา (14.60 ต่อแสนประชากร) เพชรบูรณ์ (7.05 ต่อแสนประชากร) ศรีสะเกษ (5.56 ต่อแสนประชากร) ขอนแก่น (4.75 ต่อแสนประชากร) พะเยา (4.31 ต่อแสนประชากร)


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคใต้ 2.31 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.10 ต่อแสนประชากร ภาคเหนือ 0.80 ต่อแสนประชากร ภาคกลาง 0.79 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ



- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (36 ราย), 45-54 ปี (34 ราย), 55-64 ปี (33 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (67 ราย), 45-54 ปี (57 ราย), 55-64 ปี (53 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (26 ราย), 55-64 ปี (21 ราย), 45-54 ปี (16 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (55 ราย), 25-34 ปี (46 ราย), 45-54 ปี (42 ราย),



Number of T.B. other organs cases by week of onset and region. 2565



```
select ORGANISM,count(*),count(*)*100/736 as pporg from d3465 group by ORGANISM order by ORGANISM
```

| ชนิดของเชื้อ/สาร | จำนวน | ร้อยละ |
|-------------------|-------|--------|
| T.B Lymph node | 127 | 17.3 |
| T.B. other organs | 8 | 1.1 |
| Unknown | 601 | 81.7 |