รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง ๕๐๖ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

STI Total

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค พบผู้ป่วย 18751 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2565 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 17 สค 65 จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 28.23 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.90 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (37.73 %) 25-34 ปี (24.16 %) 35-44 ปี (12.95 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 93.5 พม่าร้อยละ 3.1 อื่นๆร้อยละ 2.3 กัมพูชาร้อยละ 0.6 ลาวร้อยละ 0.5 มาเลเซียร้อยละ 0.0 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.0 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 33.2 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 28.6 นักเรียนร้อยละ 18.7 เกษตรร้อยละ 7.4 อื่นๆร้อยละ 4.3 งานบ้านร้อยละ 2.8 ข้าราชการร้อยละ 1.4 ค้าขายร้อยละ 1.4 ทหารร้อยละ 1.2 นักบวชร้อยละ 0.2 ครูร้อยละ 0.2 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร้อยละ 0.2 อาชีพพิเศษSTIร้อยละ 0.1 ประมงร้อยละ 0.1

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ ภูเก็ต (84.35 ต่อแสนประชากร) เชียงราย (81.96 ต่อแสนประชากร) กรุงเทพมหานคร (71.29 ต่อแสนประชากร) ระยอง (69.13 ต่อแสนประชากร) เชียงใหม่ (62.71 ต่อแสนประชากร)
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคกลาง 36.00 ต่อแสนประชากร ภาคเหนือ 34.84 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20.79 ต่อแสนประชากร ภาคใต้ 18.36 ต่อแสนประชากรตามลำดับ



อัตราต่อแสนประชากร

0 | 0.01-1 | 1.01-25 | 25.01-50 | 50.01-75 | 75.01-100

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2730 ราย), 25-34 ปี (2203 ราย), 35-44 ปี (1183 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2020 ราย), 25-34 ปี (930 ราย), 35-44 ปี (479 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1801 ราย), 25-34 ปี (944 ราย), 35-44 ปี (497 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (523 ราย), 25-34 ปี (454 ราย), 35-44 ปี (270 ราย),



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health