



Chancroid

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2565 พบผู้ป่วย 1044 ราย จาก 75 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.58 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.72 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (39.94 %) 25-34 ปี (24.04 %) 35-44 ปี (12.74 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.6 อื่นๆร้อยละ 1.8 พม่าร้อยละ 1.4 ลาวร้อยละ 0.5 กัมพูชาร้อยละ 0.5 มาเลเซียร้อยละ 0.2 อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 37.3 นักเรียนร้อยละ 24.2 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 18.5

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสมุทรสงคราม ลำพูน ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (159 ราย), 25-34 ปี (109 ราย), 35-44 ปี (59 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (107 ราย), 25-34 ปี (55 ราย), >65 ปี (27 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (111 ราย), 25-34 ปี (42 ราย), 35-44 ปี (29 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (45 ราย), 15-24 ปี (40 ราย), 35-44 ปี (30 ราย),



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health