



## Leptospirosis

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2565 พบผู้ป่วย 3734 ราย จาก 69 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 5.64 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 45 ราย คิดเป็นอัตราราย 0.07 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.27 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 45-54 ปี (18.93 %) 55-64 ปี (17.22 %) 35-44 ปี (17.14 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.8 พม่าร้อยละ 2.6 ลาวร้อยละ 0.3 อื่นๆ ร้อยละ 0.2 กัมพูชาร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรร้อยละ 38.8 รับจ้างร้อยละ 27.3 นักเรียนร้อยละ 12.9

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม สิงห์บุรี สระบุรี ชัยนาท อ่างทอง ตราด พิจิตร ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (39 ราย), 25-34 ปี (37 ราย), 45-54 ปี (35 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (290 ราย), 45-54 ปี (268 ราย), >65 ปี (216 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (165 ราย), 55-64 ปี (161 ราย), >65 ปี (139 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (312 ราย), 35-44 ปี (304 ราย), 15-24 ปี (246 ราย),



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health