



Scrub Typhus

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2565 พบผู้ป่วย 6218 ราย จาก 67 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 9.40 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 4 ราย คิดเป็นอัตราราย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.75 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 55-64 ปี (17.74 %) 45-54 ปี (17.59 %) 35-44 ปี (15.36 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 98.1 พม่าร้อยละ 1.3 อื่นๆร้อยละ 0.4 ลาวร้อยละ 0.2 มาเลเซียร้อยละ 0.0 กัมพูชาร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรร้อยละ 39.5 รับจ้างร้อยละ 24.6 นักเรียนร้อยละ 14.6

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (18 ราย), 25-34 ปี (15 ราย), >65 ปี (14 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (435 ราย), >65 ปี (398 ราย), 45-54 ปี (364 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (604 ราย), 35-44 ปี (603 ราย), 25-34 ปี (569 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (118 ราย), 45-54 ปี (108 ราย), >65 ปี (102 ราย),



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health