Scrub Typhus

d50665

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2565 พบผู้ป่วย 6227 ราย จาก 67 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 9.41 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 3 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.75 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 55-64 ปี (17.81 %) 45-54 ปี (17.71 %) 35-44 ปี (15.22 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 97.8 พม่าร้อยละ 1.5 อื่นๆร้อยละ 0.4 ลาวร้อยละ 0.3 กัมพูชาร้อยละ 0.0 มาเลเซียร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรร้อยละ 39.6 รับจ้างร้อยละ 24.7 นักเรียนร้อยละ 14.6

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (19 ราย), 25-34 ปี (16 ราย), 55-64 ปี (15 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (441 ราย), >65 ปี (402 ราย), 45-54 ปี (371 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (606 ราย), 35-44 ปี (601 ราย), 25-34 ปี (570 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (117 ราย), 45-54 ปี (107 ราย), >65 ปี (99 ราย),

This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร

0 | 0.01-0.20 | 0.21-0.40 | 0.41-0.60 | 0.61-0.80 | 0.81-1



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health