

Mushroom poisoning


d50665

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2565 พบผู้ป่วย 1962 ราย จาก 56 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 2.97 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 3 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.75 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ >65 ปี (24.82 %) 55-64 ปี (22.73 %) 45-54 ปี (20.90 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 98.7 ลาวร้อยละ 0.6 พม่าร้อยละ 0.6 อื่นๆร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ ในปกครองร้อยละ 37.2 เกษตรร้อยละ 33.3 รับจ้างร้อยละ 14.1


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (18 ราย), 55-64 ปี (14 ราย), 45-54 ปี (14 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (440 ราย), 55-64 ปี (399 ราย), 45-54 ปี (349 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (38 ราย), 35-44 ปี (36 ราย), >65 ปี (29 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (16 ราย), 35-44 ปี (15 ราย), 45-54 ปี (9 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



Number of Mushroom poisoning cases by week of onset and region

2565

