

Filariasis



ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มค 2565 - 25 กค 65 พบผู้ป่วย 4 ราย จาก 4 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.01 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.00 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ >65 ปี (50.00 %) 25-34 ปี (25.00 %) 35-44 ปี (25.00 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 75.0 พม่าร้อยละ 25.0 อาชีพสวนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 50.0 งานบ้านร้อยละ 25.0 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 25.0

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ ยะลา (0.18 ต่อแสนประชากร) ฉะเชิงเทรา (0.14 ต่อแสนประชากร) ระยอง (0.13 ต่อแสนประชากร) ชลบุรี (0.06 ต่อแสนประชากร)

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคกลาง 0.01 ต่อแสนประชากร ภาคใต้ 0.01 ต่อแสนประชากร ภาคเหนือ 0.00 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.00 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ



- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (2 ราย), 35-44 ปี (1 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (1 ราย),



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health