

# Filariasis



d50665

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2565 พบผู้ป่วย 14 ราย จาก 8 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.02 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 2.50 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (21.43 %) 35-44 ปี (21.43 %) 45-54 ปี (14.29 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 92.9 พม่าร้อยละ 7.1 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 35.7 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 14.3 เกษตรร้อยละ 14.3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (1 ราย), 15-24 ปี (1 ราย), >65 ปี (1 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (2 ราย), 45-54 ปี (2 ราย), 1 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (1 ราย), 25-34 ปี (1 ราย),



Number of Filariasis cases by week of onset and region.

2565

