

Filariasis

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2565 พบผู้ป่วย 7 ราย จาก 7 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.01 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.75 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (28.57 %) 25-34 ปี (14.29 %) 35-44 ปี (14.29 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 85.7 พม่าร้อยละ 14.3 อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 28.6 ไม่ทราบอาชีพ/ไม่ปกครองร้อยละ 28.6 ประมงร้อยละ 14.3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ

แรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (1 ราย), 15-24 ปี (1 ราย), >65 ปี (1 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 1 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (1 ราย), 25-34 ปี (1 ราย),

