


Condyloma Acuminata

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2565 พบผู้ป่วย 3204 ราย จาก 75 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 4.84 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.87 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (44.29 %) 25-34 ปี (25.56 %) 35-44 ปี (12.58 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 93.4 อื่นๆร้อยละ 3.8 พม่าร้อยละ 1.6 ลาวร้อยละ 0.6 กัมพูชาร้อยละ 0.4 มาเลเซียร้อยละ 0.1 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 30.2 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 26.0 นักเรียนร้อยละ 25.6


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสมุทรสงคราม พิจิตร

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (500 ราย), 25-34 ปี (390 ราย), 35-44 ปี (158 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (435 ราย), 25-34 ปี (206 ราย), 35-44 ปี (107 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (360 ราย), 25-34 ปี (137 ราย), 35-44 ปี (68 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (124 ราย), 25-34 ปี (86 ราย), 35-44 ปี (70 ราย),



Number of Condyloma Acuminata cases by week of onset and regio 2565



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health