

Chikungunya

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2565 พบผู้ป่วย 1328 ราย จาก 47 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 2.01 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.34 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 45-54 ปี (19.28 %) 35-44 ปี (19.20 %) 25-34 ปี (17.62 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 91.9 อื่นๆร้อยละ 7.4 พม่าร้อยละ 0.5 ลาวร้อยละ 0.1 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 35.8 รับจ้างร้อยละ 21.5 นักเรียนร้อยละ 14.8

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ

แรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ


- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (195 ราย), 25-34 ปี (169 ราย), 45-54 ปี (160 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (72 ราย), 55-64 ปี (59 ราย), 25-34 ปี (53 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (15 ราย), 25-34 ปี (9 ราย), 55-64 ปี (8 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (9 ราย), 35-44 ปี (5 ราย), 25-34 ปี (3 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



Number of Chikungunya cases by week of onset and region.



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health