

Zika virus

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2565 พบผู้ป่วย 191 ราย จาก 14 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.29 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.77 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 35-44 ปี (18.32 %) 25-34 ปี (15.71 %) 15-24 ปี (14.66 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 99.0 พม่าร้อยละ 0.5 กัมพูชาร้อยละ 0.5 อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 22.5 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 22.5 นักเรียนร้อยละ 18.3



จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (17 ราย), 45-54 ปี (10 ราย), >65 ปี (8 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (2 ราย), 15-24 ปี (2 ราย), 0-27 วัน (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (25 ราย), 15-24 ปี (24 ราย), 35-44 ปี (18 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ



อัตราต่อแสนประชากร



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health