


## Genital Molluscum Contagiosum

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2565 พบผู้ป่วย 316 ราย จาก 22 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.48 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.26 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ >65 ปี (18.04 %) 55-64 ปี (15.51 %) 0-4 ปี (12.03 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 94.9 อื่นๆร้อยละ 4.4 พม่าร้อยละ 0.6 อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรร้อยละ 33.5 ไม่ทราบอาชีพ/ไม่ปกครองร้อยละ 25.3 นักเรียนร้อยละ 19.9

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (14 ราย), 15-24 ปี (8 ราย), 1 ปี (7 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (2 ราย), 35-44 ปี (2 ราย), 15-24 ปี (2 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (54 ราย), 55-64 ปี (48 ราย), 45-54 ปี (30 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (3 ราย), 7-9 ปี (2 ราย), 15-24 ปี (1 ราย),



er of Genital Molluscum Contagiosum cases by week of onset and r  
2565

