


## Enterovirus Fever

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2565 พบผู้ป่วย 215 ราย จาก 19 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.32 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.85 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 0-4 ปี (78.60 %) 5 ปี (7.91 %) 6 ปี (3.72 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 98.6 กัมพูชาร้อยละ 0.5 อื่นๆร้อยละ 0.5 พม่าร้อยละ 0.5 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพในปกครอง ร้อยละ 84.7 นักเรียนร้อยละ 10.7 รับจ้างร้อยละ 1.9

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 1 ปี (11 ราย), 3 ปี (9 ราย), 6-8 เดือน (7 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 3 ปี (7 ราย), 2 ปี (6 ราย), 1 ปี (4 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 7-9 ปี (2 ราย), 1 ปี (2 ราย), 5 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 2 ปี (29 ราย), 3 ปี (24 ราย), 4 ปี (23 ราย),



Number of Enterovirus Fever cases by week of onset and region.

