

Diarrhoea


d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 694782 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1049.97 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.36 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 0-4 ปี (19.68 %) >65 ปี (14.20 %) 25-34 ปี (12.92 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.1 อื่นๆร้อยละ 2.5 พม่าร้อยละ 1.0 กัมพูชาร้อยละ 0.2 ลาวร้อยละ 0.1 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.1 มาเลเซียร้อยละ 0.0 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ไม่ปกครองร้อยละ 32.6 รับจ้างร้อยละ 23.2 นักเรียนร้อยละ 20.4

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (44213 ราย), 15-24 ปี (31726 ราย), 35-44 ปี (28888 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (41777 ราย), 55-64 ปี (27363 ราย), 15-24 ปี (23964 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (22614 ราย), 55-64 ปี (15625 ราย), 15-24 ปี (14364 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (9267 ราย), 15-24 ปี (8335 ราย), >65 ปี (7188 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



Number of Diarrhoea cases by week of onset and region.

2566

