

Typhoid


d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 1234 ราย จาก 56 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.86 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.11 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 45-54 ปี (21.88 %) >65 ปี (18.56 %) 55-64 ปี (17.99 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 98.5 พม่าร้อยละ 1.0 อื่นๆร้อยละ 0.6 อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรร้อยละ 29.8 รับจ้างร้อยละ 28.6 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 14.9


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (8 ราย), >65 ปี (7 ราย), 35-44 ปี (7 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (67 ราย), 45-54 ปี (60 ราย), >65 ปี (56 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (70 ราย), 55-64 ปี (67 ราย), >65 ปี (59 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (134 ราย), >65 ปี (107 ราย), 55-64 ปี (82 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



Number of Typhoid cases by week of onset and region.

2566

