

Paratyphoid

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบรั้งป่วย 207 ราย จาก 37 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.31 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.99 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 35-44 ปี (19.81 %) 45-54 ปี (17.87 %) 55-64 ปี (15.46 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 88.9 อื่นๆร้อยละ 10.6 กัมพูชา r้อยละ 0.5 อาชีพส่วนใหญ่ “ไม่ทราบอาชีพ/ในปักครองร้อยละ 38.6 รับจำจ้างร้อยละ 21.3 เกษตรร้อยละ 17.9

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ¹
แรกคือ²
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบรากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (23 ราย), 45-54 ปี (16 ราย), 55-64 ปี (12 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบรากในกลุ่มอายุ >65 ปี (6 ราย), 55-64 ปี (5 ราย), 35-44 ปี (4 ราย),
- ภาคเหนือ พบรากในกลุ่มอายุ >65 ปี (13 ราย), 45-54 ปี (9 ราย), 25-34 ปี (7 ราย),
- ภาคใต้ พบรากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (11 ราย), 55-64 ปี (8 ราย), 15-24 ปี (7 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร

<input type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.01-0.20	<input type="checkbox"/> 0.21-0.40
<input type="checkbox"/> 0.41-0.60	<input checked="" type="checkbox"/> 0.61-0.80	<input type="checkbox"/> 0.81-1

Number of Paratyphoid cases by week of onset and region.

2566

