



H.conjunctivitis

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 47353 ราย จาก 75 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 71.56 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.18 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 55-64 ปี (13.33 %) >65 ปี (13.25 %) 45-54 ปี (12.97 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.5 อื่นๆร้อยละ 2.0 พม่าร้อยละ 1.2 ลาวร้อยละ 0.2 กัมพูชาร้อยละ 0.1 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.0 มาเลเซียร้อยละ 0.0 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 26.2 นักเรียนร้อยละ 22.6 เกษตรร้อยละ 20.2

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสงขลา สตูล ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (1347 ราย), 35-44 ปี (1309 ราย), >65 ปี (1299 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (2827 ราย), 55-64 ปี (2797 ราย), 45-54 ปี (2793 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (1562 ราย), >65 ปี (1458 ราย), 45-54 ปี (1305 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (1218 ราย), 35-44 ปี (1092 ราย), 25-34 ปี (1018 ราย),



Number of H.conjunctivitis cases by week of onset and region.

2566

