

## Meningococcal Meningitis


d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 22 ราย จาก 13 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.03 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 2 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.57 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (27.27 %) 0-4 ปี (22.73 %) 55-64 ปี (13.64 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.5 พม่าร้อยละ 4.5 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 31.8 รับจ้างร้อยละ 27.3 ทหารร้อยละ 13.6


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2 ราย), >65 ปี (1 ราย), 55-64 ปี (1 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 1 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (4 ราย), 1-3 เดือน (2 ราย), 55-64 ปี (2 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



Number of Meningococcal Meningitis cases by week of onset and regi

