Measles Total

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 414 ราย จาก 54 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.63 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.87 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 0-4 ปี (30.92 %) 25-34 ปี (13.77 %) 15-24 ปี (12.56 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 94.4 อื่นๆร้อยละ 4.8 พม่าร้อยละ 0.2 ลาวร้อยละ 0.2 กัมพูชาร้อยละ 0.2 อาชีพส่วนใหญ่ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 49.5 นักเรียนร้อยละ 27.3 รับจ้างร้อยละ 14.3 งานบ้านร้อยละ 2.2 เกษตรร้อยละ 1.9 ข้าราชการร้อยละ 1.7 อื่นๆร้อยละ 1.7 ค้าขายร้อยละ 0.7 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร้อยละ 0.5 ทหารร้อยละ 0.2

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (25 ราย), 35-44 ปี (22 ราย), 15-24 ปี (22 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (16 ราย), 25-34 ปี (11 ราย), 9-11 เดือน (11 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (11 ราย), 15-24 ปี (10 ราย), 10-14 ปี (6 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 9-11 เดือน (15 ราย), 1 ปี (13 ราย), 7-9 ปี (12 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร

0 | 0.01-0.20 | 0.21-0.40 | 0.41-0.60 | 0.61-0.80 | 0.81-1



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health