

## Measles c Complication



d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 58 ราย จาก 25 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.09 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.15 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 0-4 ปี (24.14 %) 10-14 ปี (15.52 %) 15-24 ปี (13.79 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 94.8 อื่นๆร้อยละ 3.4 กัมพูชาร้อยละ 1.7 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 55.2 นักเรียนร้อยละ 25.9 รับจ้างร้อยละ 10.3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (3 ราย), 1 ปี (3 ราย), >65 ปี (3 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (4 ราย), 45-54 ปี (3 ราย), 25-34 ปี (3 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (1 ราย), 3 ปี (1 ราย), 1 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (6 ราย), 9-11 เดือน (3 ราย), 25-34 ปี (2 ราย),



Number of Measles c Complication cases by week of onset and region

