

D.H.F.


d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 38723 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 58.52 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 50 ราย คิดเป็นอัตราราย 0.08 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.94 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (22.35 %) 25-34 ปี (15.90 %) 10-14 ปี (15.32 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 94.8 อื่นๆร้อยละ 2.3 พม่าร้อยละ 2.0 กัมพูชาร้อยละ 0.4 ลาวร้อยละ 0.4 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.1 มาเลเซียร้อยละ 0.0 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 38.6 รับจ้างร้อยละ 23.3 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 20.3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (3068 ราย), 25-34 ปี (2247 ราย), 10-14 ปี (1805 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1932 ราย), 10-14 ปี (1751 ราย), 25-34 ปี (879 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (1623 ราย), 15-24 ปี (1432 ราย), 35-44 ปี (1077 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2223 ราย), 10-14 ปี (1614 ราย), 25-34 ปี (1407 ราย),



Number of D.H.F. cases by week of onset and region. 2566

