


D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 1293 ราย จาก 74 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.95 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 115 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.17 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.07 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (24.21 %) 10-14 ปี (19.03 %) 25-34 ปี (15.08 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 94.2 พม่าร้อยละ 2.7 อื่นๆร้อยละ 1.8 กัมพูชาร้อยละ 0.8 ลาวร้อยละ 0.5 เวียดนามร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 45.9 รับจ้างร้อยละ 26.8 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 11.6

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสมุทรสงคราม มุกดาหาร อำนาจเจริญ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (159 ราย), 10-14 ปี (103 ราย), 25-34 ปี (98 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (73 ราย), 15-24 ปี (40 ราย), 7-9 ปี (18 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (34 ราย), 25-34 ปี (29 ราย), 35-44 ปี (22 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (80 ราย), 25-34 ปี (54 ราย), 10-14 ปี (50 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio
2566

