

Malaria

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 5142 ราย จาก 59 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 7.77 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 4 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.55 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (23.01 %) 25-34 ปี (16.65 %) 35-44 ปี (13.79 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 72.7 พม่าร้อยละ 21.6 อื่นๆร้อยละ 5.5 ลาว ร้อยละ 0.1 กัมพูชาร้อยละ 0.1 จีน/อ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 27.7 รับจ้างร้อยละ 24.8 เกษตรร้อยละ 22.0

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ
แรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พbmagaในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (319 ราย), 25-34 ปี (260 ราย), 35-44 ปี (254 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พbmagaในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (14 ราย), 15-24 ปี (6 ราย), 55-64 ปี (5 ราย),
- ภาคเหนือ พbmagaในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (772 ราย), 25-34 ปี (487 ราย), 10-14 ปี (353 ราย),
- ภาคใต้ พbmagaในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (104 ราย), 45-54 ปี (97 ราย), 25-34 ปี (95 ราย),




This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร

0 0.01-10 >10-50
 >50-100 >100-500 >500

Number of Malaria cases by week of onset and region.
2566



ชนิดของเชื้อ/สาร	จำนวน	ร้อย
PF : Plasmodium falciparum	76	1.5
PV : Plasmodium vivax	3034	59.0
PM : Plasmodium malariae	47	0.9
Mixed type	8	0.2
Unknown	1977	38.4