

STI Total

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 51859 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 78.37 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 6 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.74 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (40.38 %) 25-34 ปี (23.69 %) 35-44 ปี (12.29 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 92.3 อื่นๆร้อยละ 3.4 พม่าร้อยละ 2.7 กัมพูชาร้อยละ 0.8 ลาวร้อยละ 0.7 จีน/อื่นๆ/ไม่ทราบ 0.1 มาเลเซียร้อยละ 0.0 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 34.2 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 25.7 นักเรียนร้อยละ 22.2 เกษตรร้อยละ 6.1 อื่นๆร้อยละ 4.3 งานบ้าน ร้อยละ 2.6 ข้าราชการร้อยละ 1.5 ทหารร้อยละ 1.4 ค้าขายร้อยละ 1.2 นักบวชร้อยละ 0.2 ครูร้อยละ 0.2 อาชีพพิเศษ STI ร้อยละ 0.2 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร้อยละ 0.1 ประมงร้อยละ 0.1 เลี้ยงสัตว์ร้อยละ 0.0

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ

แรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พbmagaในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (7170 ราย), 25-34 ปี (5539 ราย), 35-44 ปี (3035 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พbmagaในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (7051 ราย), 25-34 ปี (3085 ราย), 35-44 ปี (1477 ราย),
- ภาคเหนือ พbmagaในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (4936 ราย), 25-34 ปี (2351 ราย), 35-44 ปี (1152 ราย),
- ภาคใต้ พbmagaในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1783 ราย), 25-34 ปี (1309 ราย), 35-44 ปี (711 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร

