

## Syphilis

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 20347 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 30.75 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 6 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.66 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (38.17 %) 25-34 ปี (27.24 %) 35-44 ปี (11.94 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 90.9 พม่าร้อยละ 4.1 อื่นๆร้อยละ 2.8 ก้มพูราษัยร้อยละ 1.3 ลาวร้อยละ 0.8 จีน/อ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.0 เวียดนามร้อยละ 0.0 มาเลเซียร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 40.3 ไม่ทราบอาชีพ/ในปักตรองร้อยละ 26.1 นักเรียนร้อยละ 17.3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ

แรกคือ


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พbmagaในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (3081 ราย), 25-34 ปี (2478 ราย), 35-44 ปี (1143 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พbmagaในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2580 ราย), 25-34 ปี (1470 ราย), 35-44 ปี (563 ราย),
- ภาคเหนือ พbmagaในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1571 ราย), 25-34 ปี (1002 ราย), 35-44 ปี (419 ราย),
- ภาคใต้ พbmagaในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (592 ราย), 15-24 ปี (534 ราย), 35-44 ปี (305 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



Number of Syphilis cases by week of onset and region.

2566

