

Gonorrhoea


d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 12227 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 18.48 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.15 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (59.97 %) 25-34 ปี (20.04 %) 35-44 ปี (7.14 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 94.8 อื่นๆร้อยละ 2.8 พม่าร้อยละ 1.7 ลาวร้อยละ 0.4 กัมพูชาร้อยละ 0.2 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.0 มาเลเซียร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 36.6 รับจ้างร้อยละ 28.4 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 20.9


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2036 ราย), 25-34 ปี (1090 ราย), 35-44 ปี (405 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2771 ราย), 25-34 ปี (642 ราย), 35-44 ปี (229 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1913 ราย), 25-34 ปี (502 ราย), 35-44 ปี (165 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (613 ราย), 25-34 ปี (216 ราย), 35-44 ปี (74 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



Number of Gonorrhoea cases by week of onset and region.
2566

