



N.S.U./V

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 3740 ราย จาก 76 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 5.65 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.28 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (27.81 %) 25-34 ปี (19.52 %) 35-44 ปี (12.94 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 88.7 อื่นๆร้อยละ 8.1 พม่าร้อยละ 2.1 ลาวร้อยละ 0.7 กัมพูชาร้อยละ 0.2 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.1 เวียดนามร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 36.3 รับจ้างร้อยละ 24.5 นักเรียนร้อยละ 18.9

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดพิจิตร ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (423 ราย), 25-34 ปี (393 ราย), 35-44 ปี (277 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (281 ราย), 25-34 ปี (106 ราย), >65 ปี (97 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (207 ราย), 25-34 ปี (128 ราย), >65 ปี (84 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (129 ราย), 25-34 ปี (103 ราย), 35-44 ปี (63 ราย),



Number of N.S.U./V cases by week of onset and region.
2566

